

Què saps de les paparres?

Què fas si te'n trobes una?

Les paparres són àcars que parasiten animals vertebrats de sang calenta com ara gossos, ovelles o conills. També poden parasitar persones.


- S'alimenten tot xuclant la sang sense provocar dolor o picor.
- Les paparres són al terra de les zones on hi ha plantes i arbustos, o zones boscoses, i s'enganxen als animals o les persones quan hi passen.
- Si és un nen, la paparra s'enfila fins al cuir cabellut.

Cal revisar el cuir cabellut del nen, i la roba, i la pell.

Si el nen té una paparra enganxada al cuir cabellut, cal desenganxar-la amb molta cura.

Cal fer-ho amb unes pinces:

- Heu d'agafar la paparra amb les pinces ben a prop de la boca, al cap,
- i estirar a poc a poc amb un moviment lent i sostingut.



No l'agafeu amb les mans: feu servir guants, paper de vàter.

De seguida heu de rentar la zona amb aigua i sabó, i renteu-vos les mans.

- Recordeu que no heu d'intentar treure la paparra mitjançant quelcom calent, ni amb oli, alcohol, vaselina, etc.
- Tampoc no heu d'intentar de treure-la tot retorçant-la: ben al contrari, cal evitar d'estripar la paparra.

I ara, què n'hem de fer?

El més probable és que la paparra no hagi transmés cap malaltia, però en considerar que poden actuar com agent transmissor de nombroses malalties, cal parar atenció a l'evolució del pacient.

Truqueu a l'ambulatori, o al 061, o a Sanitat Respon (902 111 444) si el nen presenta alguns d'aquests símptomes:

- Febre, mal de cap.
- Dolors articulars o musculars, com si fos la grip.
- Inflamació dels ganglis del coll, o rigidesa del coll.
- Qualsevol erupció a la pell.
- Una taca vermella o negra al cuir cabellut, allà on hi era la paparra.

Les paparres també poden provocar debilitat, falta de coordinació muscular, formigueig, palpitations, dificultat per respirar, paràlisi.